

Sebességtranszformáció

A K rendszerben mérve a test sebessége a pozitív x irányban $u_x = \Delta x / \Delta t$.

A K' rendszer a K -hoz képest a pozitív x irányban halad v sebességgel.

Az x irányú sebességkomponens a K' rendszerben mérve:

$$u_x' = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = \frac{\gamma(\Delta x - v\Delta t)}{\gamma\left(\Delta t - \frac{\Delta x v}{c^2}\right)} \cdot \frac{\Delta t}{\Delta t} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \quad \text{ahol } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Amennyiben a mozgó rendszerből szeretnénk u_x' -t átranszformálni a nyugvó rendszerbe, akkor mindenhová v helyett $-v$ -t kell írni:

$$u_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\gamma(\Delta x' + v\Delta t')}{\gamma\left(\Delta t' + \frac{\Delta x' v}{c^2}\right)} \cdot \frac{\Delta t'}{\Delta t'} = \frac{u_x' + v}{1 + \frac{u_x' v}{c^2}}$$

A v sebességre merőleges komponensek transzformációja:


$$u_y' = \frac{\Delta y'}{\Delta t'} = \frac{\Delta y}{\gamma\left(\Delta t - \frac{\Delta x v}{c^2}\right)} \cdot \frac{\Delta t}{\Delta t} = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \quad \text{és} \quad u_z' = \frac{\Delta z'}{\Delta t'} = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Az ellenkező irányba transzformálva pedig:

$$u_y = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{\Delta y'}{\gamma\left(\Delta t' + \frac{\Delta x' v}{c^2}\right)} \cdot \frac{\Delta t'}{\Delta t'} = \frac{u_y'}{\gamma\left(1 + \frac{u_x' v}{c^2}\right)} \quad \text{és} \quad u_z = \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{u_z'}{\gamma\left(1 + \frac{u_x' v}{c^2}\right)}$$

Példa:

Földhöz képest nyugatról $0,9c$ sebességgel érkező UFO1 ütközik a kelet felől érkező, szintén $0,9c$ sebességű UFO2-vel. Mennyi a relatív sebességük az ütközés előtt?



Megoldás: A Földhöz rögzített rendszer a K .

Ebben: $u_{1x} = 0,9c$ és $u_{2x} = -0,9c$

A K' rendszert pedig UFO1-hez rögzítjük.

Így $u_{1x}' = 0$ természetesen, keressük u_{2x}' -t:

$$u_{2x}' = \frac{u_{2x} - v}{1 - \frac{u_{2x}v}{c^2}} = \frac{-0,9c - 0,9c}{1 + \frac{(0,9c)^2}{c^2}} = \frac{-1,8c}{1 + 0,9^2} = -0,9945c$$

Példa:


Egy a K rendszerben nyugvó megfigyelő a $+y$ tengely irányában terjedő fényjelet észlel. A másik megfigyelő a pozitív x tengely irányában távolodik az első megfigyelőtől $0,5c$ sebességgel.

Határozzuk meg a fényjel terjedési sebességét és irányát a második megfigyelőhöz képest!

A tömeg fogalma

A klasszikus (newtoni) mechanikában a tömeg a tehetetlenség mértéke.

Két tömegpont ütközése esetén a sebességváltozások aránya a tömegek arányának reciprokja:



$$\frac{|\vec{v}_{A2} - \vec{v}_{A1}|}{|\vec{v}_{B2} - \vec{v}_{B1}|} = \frac{m_B}{m_A}$$

Tömeg relativisztikus mozgás esetén


Legyen két megfigyelő A és B , akik egymáshoz képest nyugalomban vannak, és egymásnak dobnak két ugyanolyan ($m_A = m_B = m_0$) labdát azonos u_0 nagyságú sebességgel, melyek rugalmasan ütköznek.

A két labda ütközés után ugyanolyan u_0 nagyságú sebességgel pattan vissza A és B kezébe.

Így aztán természetesen:


$$\frac{2u_0}{2u_0} = \frac{m_B}{m_A} = 1$$

Most mozogjon A és B egymáshoz képest v sebességgel a labdák irányára merőlegesen.



Relativisztikus tömegnövekedés

Legyen a K vonatkoztatási rendszer az A megfigyelőhöz rögzítve.
Ekkor a labdák sebességei ütközés előtt és után:



$$\frac{m_B}{m_A} = \frac{|\Delta u_{Ay}|}{|\Delta u_{By}|} = \frac{2u_0}{2u_0/\gamma} = \gamma \quad \text{ahol } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Amennyiben $u_0 \rightarrow 0$, akkor elmondható, hogy m_A nyugalomban van, m_B pedig v nagyságú sebességgel mozog az A megfigyelőhöz képest.


$$m_A = m_0 \quad \text{nyugalmi tömeg}$$

$$m_B = \gamma m_A = \gamma m_0 \quad \text{mozgási tömeg}$$

A relativisztikus tömeg sebességfüggése

A K vonatkoztatási rendszerben nyugvó megfigyelő az u sebességű test tömegét a nyugalmi tömegnél nagyobbak méri:


$$m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$



Tömegnövekedés kísérleti bizonyítéka

Kaufmann kísérlet:

- a kondenzátor lemezei közti elektromos tér és az apró lyuk segítségével a különböző sebességű elektronok különböző y értéknél érik el a fotólemezt.
- a mágneses térben körív mentén térülnek el az elektronok.
- az y - z eloszlás alakja alapján az elektron fajlagos töltése (q/m) meghatározható, igazolva a relativisztikus tömegnövekedést!



Példa:

A NASA X-43 elnevezésű hiperszonikus repülője 2004. november 16-án a hangsebesség 9,6-szorosát érte el, vagyis kb. 11265 km/h sebességet. A robotrepülő 1400 kg tömeggel rendelkezett.

Hány grammal nőtt meg a tömege repülés közben a relativisztikus hatások miatt?




Relativisztikus lendület

A mozgó test relativisztikus tömegnövekedése miatt a lendület sem a klasszikus módon függ valójában a sebességtől, a megszokott képlet kizárólag $u \ll c$ esetén igaz.

A fény sebességével összemérhető (relativisztikus) sebességek esetén a lendület nagysága:

$$p = mu = \gamma m_0 u = \frac{m_0 u}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$



Munkatétel relativisztikus esetben

A relativisztikus tömegnövekedés miatt a Newton-törvényekből származtatott dinamika alapegyenlete az $\vec{F}_e = m_0 \vec{a}$ formában nagy sebességeknél nem érvényes!

A lendülettétel ennél viszont általánosabb, és a relativisztikus lendületet használva továbbra is érvényes:

$$\vec{F}_e = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m_0 \vec{u})}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{m_0 \vec{u}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

Induljon egy m_0 tömegű test nyugalomból, és az x irányban egy állandó nagyságú F erő gyorsítsa azt fel u_1 sebességre t_1 idő alatt x_1 távolságot megtéve.

Mivel a munkatétel szerint $W = \Delta E_K$ és a kezdeti kinetikus energia nulla, az F erő munkája a test kinetikus energiájával lesz egyenlő:

$$E_K = W = \int_0^{x_1} F dx = \int_0^{x_1} \frac{d(\gamma m_0 u)}{dt} dx = \int_0^{u_1} \frac{dx}{dt} \frac{d(\gamma m_0 u)}{du} du = \int_0^{u_1} u \frac{d(\gamma m_0 u)}{du} du = *$$

Szükségünk lesz a következőre:

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{d}{du} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{d}{du} \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}} \left(-\frac{2u}{c^2}\right) = \frac{u}{c^2} \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}$$

Relativisztikus mozgási energia

Felhasználva az előző eredményt: $\frac{d\gamma}{du} = \frac{u}{c^2} \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}$

$$\begin{aligned} \frac{d(\gamma m_0 u)}{du} &= m_0 \frac{d(\gamma u)}{du} = m_0 \left(\frac{d\gamma}{du} u + \gamma \frac{du}{du} \right) = m_0 \left[\frac{u^2}{c^2} \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}} + \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \right] = \\ &= m_0 \left[\frac{\frac{u^2}{c^2}}{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right) \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} + \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \right] = m_0 \frac{\frac{u^2}{c^2} + \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right) \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = m_0 \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Az előző oldalról folytatva:

$$\begin{aligned} E_K = W = \dots &= \int_0^{u_1} u \frac{d(\gamma m_0 u)}{du} du = m_0 \int_0^{u_1} u \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}} du = \\ &= m_0 \left[c^2 \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \right]_0^{u_1} = m_0 c^2 \left[\left(1 - \frac{u_1^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - 1 \right] \end{aligned}$$

Tehát u_1 helyett u sebességű test mozgási energiája:

$$E_K = m_0 c^2 (\gamma - 1)$$

Tömeg-energia ekvivalencia

Az u sebességű test mozgási energiájára kaptuk:

$$E_K = m_0 c^2 (\gamma - 1) = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2$$

Felmerül a kérdés, hogy mi ennek a két tagnak a jelentése.

Az első tag a test teljes energiája, a második pedig a nyugalmi energia:

$$E = E_K + E_0 \quad \text{ahol} \quad E = \gamma m_0 c^2 \quad \text{és} \quad E_0 = m_0 c^2$$

A nyugalmi energia a klasszikus fizikában ismeretlen fogalom. A testnek a nyugalmi tömegével arányos energiája van, még akkor is, ha a sebessége nulla!

A teljes energia pedig az $m = \gamma m_0$ relativisztikus tömeggel arányos.

Ez az Einstein-féle tömeg-energia ekvivalencia:

$$E = mc^2$$

A relativisztikus tömeg, illetve energia megmaradó mennyiség zárt rendszer esetén.

A mozgási energiának kis sebességnél vissza kell adnia a klasszikus képletet:


$$E_K = m_0 c^2 (\gamma - 1) = m_0 c^2 \left[\left(1 - \frac{u^2}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}} - 1 \right] \approx m_0 c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} - 1 \right) = \frac{1}{2} m_0 u^2$$

Felhasználva, hogy $(1 + \delta)^n \approx 1 + n\delta$ ha $\delta \ll 1$

Tömeg-energia ekvivalencia kísérleti bizonyítéka

Cockroft-Walton kísérlet (1932):

Nyugvó lítium atomot bombáztak felgyorsított protonokkal (néhány száz keV).



A keletkező két hélium atommagot Wilson-féle ködkamrában detektálták.

A nyugalmi tömegekre az alábbi igaz:

$$m_{0k} = m_0(H) + m_0(Li) > 2m_0(He) = m_{0v}$$

Tehát a nyugalmi tömeg csökkent: $\Delta m_0 < 0$ Ez a tömeghiány vagy tömegdefektus.

$$\frac{\Delta m_0}{m_{0k}} > 10^{-3} \quad \text{mai műszerekkel pontosan mérhető!}$$

A mozgási energia viszont növekedett:

$$E_{kk} = E_k(H) + E_k(Li) < 2E_k(He) = E_{kv}$$

A teljes energia $E = m_0c^2 + E_k$ így állandó maradt: $\Delta m_0c^2 + \Delta E_k = 0$

Mindössze annyi történt tehát, hogy a nyugalmi energia egy része átalakult mozgási energiává.

Hasonló kísérleti bizonyíték az elektron-pozitron pár szétsugárzása, amikor a részecske-antirészecske pár nyugalmi energiája két foton formájában kisugárzódik.

Energia és lendület kapcsolata

A klasszikus mozgási energia és lendület esetén:


$$E_k = \frac{1}{2} m_0 u^2 \quad \text{és} \quad p = m_0 u \quad \rightarrow \quad E_k = \frac{p^2}{2m_0}$$

A relativisztikus lendület és teljes energia kapcsolata:

$$\begin{aligned} (pc)^2 + (m_0 c^2)^2 &= \gamma^2 m_0^2 c^2 u^2 + m_0^2 c^4 = m_0^2 c^2 (\gamma^2 u^2 + c^2) = \\ &= m_0^2 c^2 \left(\frac{u^2}{1 - \frac{u^2}{c^2}} + c^2 \right) = m_0^2 c^2 \left(\frac{u^2 + c^2 - u^2}{1 - \frac{u^2}{c^2}} \right) = \gamma^2 m_0^2 c^4 = E^2 \end{aligned}$$

Az innen kifejezett nyugalmi tömeg/energia invariáns mennyiség:

$$(m_0 c^2)^2 = E^2 - (pc)^2$$



Példa:

Egy $9,11 \cdot 10^{-31}$ kg nyugalmi tömegű mozdulatlan elektront 800 kV feszültséggel felgyorsítunk.

- a) Határozza meg az elektron nyugalmi energiáját!
- b) Határozza meg az elektron mozgási energiáját, teljes energiáját, és sebességét!

Tömegdefektus

Jelölje $M(A, Z)$ az A tömegszámú és Z rendszámú atommag tömegét.


Tömegspektrométerrel megmérve azt kapjuk, hogy az atommag tömege Δm -el kisebb mint az alkotórészek (protonok és neutronok) tömege:

$$\Delta m = M(A, Z) - Zm_p - (A - Z)m_n < 0$$

Ez a **tömegdefektus** az Einstein-féle tömeg-energia ekvivalencia alapján kiszámolva éppen a **kötési energiát** adja meg (szabad alkotórészek ~ 0 energiája negatív lett, mert kötött állapotba kerültek). Tehát a kötési energia adja meg mekkora energia befektetésével tudnánk újra alkotórészeire bontani az atommagot (vagy bármely kötött rendszert).

$$E_K = \Delta mc^2 < 0$$

Az egy nukleonra jutó kötési energia meghatározható a tömegeket megmérve: $\varepsilon = E_K/A$



Ha egy folyamat során ε csökken akkor energia szabadul fel.

pl. kis magok fúziója
vagy nagy magok hasadása

ε vasra a legkisebb.

Házi feladat 2:

1. Két űrhajó A és B repülnek egymással szemben. Egy földi megfigyelő szerint A sebessége $0,75c$, B sebessége pedig $0,9c$. Mekkora a B hajó sebessége az A hajóhoz képest?
2. Egy proton nyugalmi energiája 938 MeV , teljes energiája pedig 2200 MeV .
 - a) Mekkora a proton sebessége?
 - b) Mekkora a proton lendülete